

# L'ÉCHANGE

# Revue Linnéenne

FONDÉE PAR LE DOCTEUR JACQUET

Organe mensuel des Naturalistes de la Région Lyonnaise et du Centre

CONTENANT LES DEMANDES D'ÉCHANGE

D'ACHAT OU DE VENTE DE LIVRES ET DE TOUT AUTRE OBJET D'HISTOIRE NATURELLE

**M. PIC (O. I. P., O. S.), Directeur**

Membre correspondant du Museum de Paris

COMITÉ DE RÉDACTION OU COMITÉ D'ÉTUDES

**J. Clermont**, 162, rue Jeanne-d'Arc prolongée, PARIS (13<sup>e</sup>). — *Aphodius paléarctiques, Histerides français.*

**L. Falcoz**, 5, Place de l'Éperon, VIENNE (Isère). — *Cryptophagides, Nitidulides, Cucujides, Erotylides, Phalacridés, Lathridiides.*

**Maurice PIC**, DIGOIN (Saône-et-Loire). — *Coléoptères d'Europe, Meloidae, Pitridae, Nanophyes, Anthicidae, Pedilidae, Crateridae, etc. du globe. — Cerambycides de la Chine, du Japon, etc. Cryptocéphalides paléarctiques. Malacodermes du globe.*

**A. Méquignon**, 7, rue Chasseloup-Laubat, PARIS (15<sup>e</sup>). *Coléoptères de France (Curculionides exceptés.)*

Adresser toutes Communications

Concernant la Rédaction, les Échanges, les Abonnements et les Annonces

A M. M. PIC. à Digoïn

(6 Novembre 1926)

## SOMMAIRE

Notes diverses, descriptions et diagnoses, par M. PIC (suite).  
 Sur le genre *Malthesis* Mots., par M. PIC.  
 Malacodermes exotiques, par M. PIC (suite du hors-texte).  
 Coléoptères exotiques en partie nouveaux, par M. PIC (suite).

PRIX D'ABONNEMENT : UN AN, A PARTIR DU 1<sup>er</sup> JANVIER

France : 5 francs. | Étranger : 6 francs.

MOULINS  
 LES IMPRIMERIES RÉUNIES  
 15, RUE D'ENGHIEN, 15

# ANNONCES

La page . . . . .	32 fr.	Le 1/4 de page . . . . .	10 fr.
La 1/2 page . . . . .	18 fr.	Le 1/8 de page . . . . .	6 fr.

*Réduction de 25 % pour les insertions plusieurs fois répétées*

TARIF SPECIAL POUR LES ANNONCES ANNUELLES

---

## PRIX DES SEPARATA

---

*En raison des difficultés actuelles (papiers, matières premières, main-d'œuvre, etc.), les auteurs désirant des « Separata » de leurs articles, voudront bien s'entendre directement avec l'imprimeur.*

---

## EN VENTE

---

Chez l'auteur : Maurice Pic, à Digoin (Saône-et-Loire) : 1° **Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes**, ouvrage ayant obtenu, en 1911, le prix Dollfus.

Cet ouvrage, commencé en 1891, comprend une série de fascicules ou cahiers dont les premiers sont presque épuisés. Le prix varie suivant les fascicules, celui des anciens étant plus élevé ; les plus récents peuvent être cédés à divers prix par fascicule, port non compris. L'avant-dernier cahier paru, c'est-à-dire la deuxième partie du 9° cahier, a été distribué aux souscripteurs dans le courant de février 1915, depuis a paru (en 1916) la première partie, et (en 1917) la deuxième partie du 10° cahier.

On peut céder quelques collections, avec le 1<sup>er</sup> cahier réimprimé, à des prix modérés. Envoi de l'ouvrage, contre remboursement, ou après réception de son prix.

2° **Mélanges Exotico-Entomologiques** comprenant 14 fascicules anciens au prix de 2 francs : deux autres au prix de 2 fr. 50, enfin 7 autres plus récemment édités, au prix de 3 fr. 50 pièce, port non compris. (Les autres à 4 francs (24 à 27.) Les suivants à des prix divers. Réduction de prix pour la collection complète. Petite majoration pour l'étranger. Le dernier fascicule paru est le 46.

---

## "Miscellanea Entomologica"

*Revue entomologique internationale*

Abonnement annuel, édition complète (avec ouvrages) . . . . .	20 fr.
Edition réduite . . . . .	10 fr.
Annonces seules . . . . .	5 fr.

*Direction et Rédaction : E. BARTHE*  
Professeur honoraire à CASTANET-TOLOSAN  
(Haute-Garonne).

## Pour les déterminations

*Tous les frais de retour des insectes, envoyés en étude, sont à la charge de l'envoyeur.*

*Que les intéressés s'en souviennent à l'occasion, et fassent le nécessaire !*

# L'Échange, Revue Linnéenne

## Notes diverses, descriptions et diagnoses

(Suite.)

**Leptura (Vadonia) imitatrix** var. nov. Elytris late nigris, ad humeros et externe diverse rufo notatis (v. *externerufa*), aut nigris, aliquot epipleuris solis rufis (v. *Kœchlini*), de Turquie, Hongrie, Croatie (coll. Pic).

**Vadonia mæsiaca** v. *Beali* mihi. Variété analogue à la var. *rufonotata* Pic de *bipunctata* F., décrite dans le numéro 425, offrant une coloration noire très étendue sur les élytres (celles-ci irrégulièrement marquées de roux) et attribuée tout d'abord à un exemplaire originaire de Macédoine qui se trouve au Muséum de Paris. Je possède la var. *Beali* provenant de Hongrie.

**Brachyta variabilis** v. nov. *rufimembris*. Elytres ayant chacune six macules jaunes dont une antérieure et une postérieure internes, antennes et pattes rousses. Sibérie (coll. Pic). — Intermédiaire entre les var. *instriolata* Pic et *testaceimembris* Pic.

**Dorcadion æthiops** Scop. Je possède (ex Bravard), provenant de la région de Salonique, quelques exemplaires un peu brillants, de grande taille, les ♀ ayant une forme plus ou moins élargie avec la côte humérale très nette et relativement longue, que je considère comme une race locale de *æthiops* Scop. (la forme typique se trouvant en Autriche-Hongrie), à distinguer sous le nom de v. *majoripenne*.

**Dorcadion lugubre** v. nov. *sparsopilosum*. Elongatus, parum nitidus, sparse sed distincte griseo pubescens, niger, elytris apice rufo notatis, capite thoraceque dense ruguloso-punctatis et pro parte plicatis, illo medio læve lineato; elytris diverse punctatis, infra humeros longe impressis, costa humeralis distincta, sat prolongata. Environs de Salonique (coll. Pic). — Diffère de *D. lugubre* Kr. (ex description) au moins par la pubescence très distincte et la ponctuation embrouillée par les plis sur l'avant-corps.

**Dorcadion aleppense** var. nov. *latealbum* ♀. Revêtement du dessus dense, blanchâtre avec de vagues dessins fauves réduits. Alep (coll. Pic).

**Dorcadion litigiosum** var. nov. *varnanum* ♀. Oblongo-elongatus, niger, dense griseo pubescens, capite thoraceque medio albo vittatis, medio breve fulvescentibus, elytris ad suturam multi nigro-velutino maculatis, articulo 1° antennarum, femoribus tibiisque rufis. Bulgarie: Varna (coll. Pic). — Variété très distincte par son revêtement presque entièrement gris, sans bandes marquées sur les élytres.

**Cerambyx velutinus** var. nov. *minor*. Rufescens, griseo-pubescens; antennis satis brevibus, articulo 2° breve et valde transverso, 3°-5° valde dilatato-globulosis; thorace antice et postice transverse plicato, medio reducte et irregulariter plicato et longitudinaliter indistincte carinato; elytris apice truncatis, ad suturam angulatis. Long.

25 mill. Rhodes (coll. Pic). — Sans doute race locale caractérisée par l'absence presque complète de la carène prothoracique et les articles 3 à 5 des antennes plus ou moins épaissis-noduleux, la coloration moins foncée.

*Anthonomus multifasciatus* n. sp. Oblongus, sat nitidus, rufescens aut pro parte brunneus, parum dense albo pubescens, elytris multi transverse et sinuate fasciatis; rostro sat elongato, paulo arcuato; thorace medio late albo notato, breve, antice attenuato, fortiter et sparse punctato; scutello elongato, albo pubescente; elytris thorace sat latioribus, paulo elongatis, striato-punctatis, pro parte glabris; femoribus anticis sat longe unidentatis. Long. 3 mill. Smyrne (Pic). — Voisin de *ornatus* Reiche, distinct par les élytres ornées de plusieurs fascies sinuées, non régulières.

(A suivre.)

M. Pic.

## Sur le genre « Malthesis » MOTS.

Je place dans le genre *Malthesis* Mots. une série d'espèces nouvelles, dont le faciès rappelle *Chauliognathus flavo-marginatus* Chp., et qui ont de commun : une grosse tête rétrécie en arrière avec des yeux saillants, des élytres atténuées et un peu déhiscentes, dépassées par les ailes, un prothorax subcarré, un peu plus long que large, des pattes longues, un aspect mat et l'abdomen cupuliforme au sommet chez ♂. Ces nouveautés ont la tête foncée mais plus ou moins marquée de flave près des yeux, les membres foncés, avec parfois la base des cuisses flave, le dessous du corps noir ou le plus souvent marqué de jaune, une taille variant entre 7 à 10 mill., et se distinguent entre elles ainsi qu'il suit :

1. Elytres, soit en partie orangées ou jaunes, soit foncées et ornées d'une macule apicale claire, ou au moins bordées de clair au sommet. 10
- Elytres entièrement foncées ou tout au moins marquées de foncé au sommet. 2
2. Elytres entièrement foncées sauf parfois leur repli huméral. 6
- Elytres diversement jaunes ou orangées antérieurement ou sur le disque, foncées sur le reste vers leur sommet. 3
3. Elytres largement orangées ou jaunes, soit antérieurement, soit sur le disque. 4
- Elytres noires à macule discale orangée placée vers le milieu et commune sur la suture. — Bogota. *medionotatus* n. sp.
4. Elytres largement marquées de noir au sommet, diversement orangées antérieurement. 5
- Elytres jaunes bordées de noir. Colombie. *atrocinctus* n. sp.
5. Elytres orangées à tiers apical noir. — Vénézuela. *meridanus* n. sp.
- Elytres noires ornées d'une longue bande antérieure discale orangée. — Bolivie. *ephippiatus* n. sp.
6. Prothorax noir, diversement bordé de flave, mais pas antérieurement [espèce voisine de *M. marginicollis* Kirsh]. 8
- Prothorax testacé-rougeâtre sans, ou avec, une macule discale foncée. 7
7. Prothorax assez étroit, testacé-rougeâtre, concolore. — Bolivie. *rubricollis* n. sp.

*Ditoneces atricolor* n. sp. Elongatus, nitidus, pubescens, niger, pro parte fuliginosus, coxis testaceis; antennis validis, articulo 3°-4° fere triangularibus, 4° et sequentibus apice longe dentatis; thorace breve et lato, antice subarcuato, angulis posticis paulo prominulis; elytris parum elongatis. Long. 4 mill. Sumatra. — Voisin de *lineolatus* Pic (non *Graciloplateros*), antennes plus robustes, prothorax plus court et plus foncé.

*D. paulolimbatus* n. sp. Elongatus, nitidus; pubescens, niger, thorace lateraliter postice testaceo marginato, antennis validis; thorace breve et lato, antice paulo attenuato; elytris parum elongatis. Long. 4 mill. Sumatra. — Très voisin du précédent, antennes un peu plus épaisses, tête moins dégagée du prothorax, celui-ci peu bordé de testacé et nettement rétréci en avant.

*D. longesulcatus* n. sp. Elongatus, nitidus, pubescens, niger, thorace paulo rufo marginato, elytris ad basin et circa pro parte griseo pubescentibus; antennis validis; thorace parum breve, antice subsinuato, medio prolongato, angulis posticis prominulis, paulo curvatis, in disco longe et late sulcato; elytris elongatis. Long. 6 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic). — Espèce voisine de *regularis* Pic, moins étroite, moins pubescente, antennes plus robustes, etc.

*D. atripennis* v. nov. *signatus*. Thorace rufo, medio piceo, elytris ad suturam antice et ad humeros rufo lineatis, coxis femoribusque ad basin testaceis. Sumatra (coll. Corporaal et Pic).

*D. diversitarsis* n. sp. Elongatus, nitidus, pubescens, nigro-piceus, aliquot pro parte brunnescent, thorace elytrisque ad basin pro parte testaceis, femoribus ad basin et articulo ultimo antennarum apice testaceis; antennis parum validis; thorace plus ♀, aut minus ♂, robusto, angulis posticis prominulis, testaceo, aliquot medio paulo brunnescente; scutello testaceo aut paulo brunnescente; elytris elongatis, nigro-fuliginosis, ad humeros, ad suturam et externe antice testaceis. Long. 4-5 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic). — Voisin de *testaceitarsis* Pic, en diffère par les tarses foncés, la coloration foncée plus étendue des élytres, etc.

*D. maculatipes* n. sp. Elongatus, subopacus, pubescens, rufescens, thorace scutelle elytris, his apice in disco longe nigro-fuliginosis, pedibusque pro majore parte testaceis; antennis piceis, his satis gracilibus; thorace sat breve, antice arcuato; elytris elongatis; pedibus testaceis, femoribus tibiisque nigro notatis. Long. 5 mill. Sumatra. — Voisin du précédent, prothorax non brillant et coloration différente.

*Plateros longelimbatus* n. sp. Angustatus, nitidus, pubescens, niger, scutello, coxis thoraceque testaceis, illo in disco vage brunneo bilineato, elytris longe flavo marginatis. Long. 11-12 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic). — A placer près de *lateapicalis* Pic.

*Plateros multiimpressus* n. sp. Elongatus, fere opacus, supra aurantiacus, infra corpore membrisque nigro-fuliginosis, coxis femoribusque anticis ad basin testaceis, antennis validis, apice attenuatis; thorace parum elongato, lateraliter recto, antice subarcuato, supra multi impresso; scutello lato; elytris thorace paulo latioribus, parum elongatis, 4-costulatis. Long. 8 mill. Tonkin. — Espèce très distincte par son prothorax multiimpressionné. A placer près de *subrecticollis* Pic.

HORS-TEXTE DE L'*Echange*, n° 426.

**Odontocerus parallelus** n. sp. Angustatus, parallelus, niger, pedibus paulo brunnescentibus, thorace, scutello elytrisque aurantiacis; antennis deplanatis, dentatis; thorace parum breve, antice et lateraliter subsinuato, 7 areolato, angulis posticis fere rectis; elytris distincte 4 costatis, intervallis bilineato punctatis. Long. 12 mill. Tonkin. — Voisin de *atronotatus* Pic, prothorax différent et élytres non marquées de foncé.

**Cladophorus laosensis** n. sp. ♀. Parum elongatus, niger, thorace, scutello elytrisque aurantiacis, antennis deplanatis, dentatis; thorace parum lato, antice et lateraliter sinuato, 7 areolato, angulis posticis subcurvatis; elytris parum latis, postice paulo dilatatis, 4 costatis, intervallis bilineato quadrato-punctatis. Long. 18 mill. Laos (ex Vitalis). — Voisin de *inapicalis* Pic, plus large, prothorax fortement sinué sur son pourtour, etc.

**Metriorrhynchus flavicolor** n. sp. Valde angustatus, subnitidus, nigro-piceus, thorace, scutello elytrisque flavis, thorace 4 areolato, elongato et angustato, antice medio angulato prolongato; elytris mediocre costatis, intervallis sat regulariter biserialo punctatis. Long. 10 mill. Indes. — A placer près de *sericeus* Wat., en diffère au moins par le prothorax nettement avancé sur son milieu antérieur.

**Xylobanus laosensis** n. sp. Angustatus, niger, thorace, scutello elytrisque aurantiacis; antennis deplanatis dentatis; thorace 7 areolato, sat elongato, lateraliter sinuato, antice medio valde prolongato, angulis posticis longe prominulis; intervallis elytrorum transverse fenestratis. Long. 10 mill. Laos. — Voisin de *fastidiosus* Wat., s'en distingue, à première vue, par la particulière structure du prothorax.

Le **X. Phungi** mihi, du Tonkin, voisin du précédent par la structure élytrale et la coloration analogue, possède un prothorax différent, non prolongé sur son milieu antérieur, subarqué en avant, un peu rétréci au milieu sur les côtés avec les angles postérieurs courts.

**X. nigrofenestratus** n. sp. Satis elongatus, subnitidus, niger, thorace testaceo, in disco nigro notato, elytris piceis, costis et costulis pro parte testaceis, thorace breve et lato, antice sinuato, 5 areolato. Long. 10 mill. Tonkin. — Voisin de *nigropunctatus* Pic, moins allongé avec la coloration du dessus différente, en partie testacée.

**Libnetis niger** n. sp. Parum elongatus, subnitidus, nigro-piceus, pedibus pro parte pallidioribus, antennis elongatis, ad basin crassis; thorace breve et lato, antice paulo attenuato, angulis posticis prominulis, antice distincte granuloso; elytris lateraliter sinuatis et paulo dehiscentibus, distincte et multi costatis. Long. 3,5 Tonkin. — Moins allongé, plus brillant que *opacus* Pic, avec, en outre, les élytres plus nettement costées.

**Libnetomorphus longipennis** n. sp. Angustatus, nigro-piceus aut pro parte brunnescens, supra testaceus, elytris apice late nigris, articulis primis antennarum pro parte, coxis femoribusque ad basin testaceis. Long. 5 mill. Sumatra (coll. Corporaal et Pic). — Voisin de *diversicollis* Pic, en diffère par la forme plus allongée, le prothorax nettement avancé sur son milieu antérieur, les yeux plus grands, etc.

**Platerodrilus reductus** n. sp. Oblongo-elongatus, nigro-piceus, coxis et infra corpore pro parte rufis, supra aurantiacus, elytris apice parum late nigris. Long. 6 mill. Tonkin. — Voisin de *Corporaali* Pic, élytres moins longues et non parallèles, à coloration noire moins étendue.

**Gorhamia parallela** n. sp. Subparallelus, nitidus, nigro-piceus, capite, thorace, scutello, elytris ad basin late, pectore femoribusque pro parte rufis. Long. 5 mill. Sumatra. — Très distinct de *impressithorax* Pic, par la forme parallèle, les élytres moins largement noires, les antennes plus courtement dentées.

**Attalus Stotzneri** n. sp. Elongatus ♂, aut oblongo-elongatus ♀, hirsutus, nitidus, niger, elytris paulo subæneis, antennis ad basin plus minusve testaceis, his parum gracilibus. Long. 2,5-2,8 mill. Thibet. — Très voisin de *incertus* Pic, prothorax plus lisse, élytres moins longues, à ponctuation plus fine et un peu bronzées.

**Lycocerus Coomani** n. sp. Elongatus, niger, elytris, thoraceque circa ochreatis, illo medio plus minusve piceo aut brunnescente, antice paulo attenuato, antennis parum crassis; elytris sat angustatis, subcostulatis. Long. 8 mill. Tonkin. — Espèce reconnaissable, à première vue, par sa coloration non pourprée et ses antennes peu aplaties.

**L. pallidior** n. sp. Elongatus, nigro-piceus, membris brunnescentibus, thorace, scutello, elytris que testaceis; antennis sat validis; thorace sat elongato, subparallelo, ante medium trifoveolato; elytris parum latis, costulatis. Long. 10 mill. Tonkin. — Distinct du précédent par la tête moins large par rapport au prothorax, et ce dernier différent.

**Cantharis Duporti** n. sp. Parum elongatus, nitidus, testaceus, antennis, femoribus apice, tibiis plus minusve tarsisque nigris; thorace antice arcuato. Long. 12 mill. Indochine. — Voisin de *laokaiensis* Pic, moins étroit, élytres de la coloration du prothorax, etc.

**C. Meillieri** n. sp. Parum elongatus, fere opacus, niger, supra rufus; thorace antice arcuato. Long. 13 mill. Laos (ex Vitalis). — Plus large que le précédent, non brillant, avec le dessus roux.

**Themus rufoscutus** n. sp. Elongatus, postice attenuatus, nitidus, rufo-testaceus, capite postice, thorace medio pedibusque nigris, femoribus ad basin rufo-testaceis, elytris cyaneis. Long. 10 mill. Tonkin. — Voisin de *chapaensis* Pic par la coloration, en diffère par les élytres bleues et plus courtes, l'écusson roux, etc.

**Rhagonycha rubrithorax** n. sp. Parum elongatus, fere opacus, niger, thorace capiteque rubris, illo supra postice nigro; antennis sat validis, capite postice paulo attenuato, oculis prominulis; thorace sat elongato, lateraliter ante medium paulo strangulato, medio sulcatulo, postice gibbuloso; elytris thorace paulo latioribus, sat brevibus, fere opacis; unguibus fassis. Long. 8 mill. Tonkin. — Espèce de forme particulière qui mériterait peut-être la création d'une division sous-générique, ou générique, nouvelle.

**Drilosilis dentatus** n. sp. ♀. Parum elongatus, nitidus, niger, thorace rufo; antennis parum validis; thorace breve et lato, lateraliter medio gibbuloso-plicato, postice paulo inciso, angulis posticis acutis; elytris thorace paulo latioribus, sinuatis, minute ruguloso-punctatis. Long. 5 mill. Tonkin. — Voisin de *carinatus* Pic, en diffère par les élytres moins longues, le prothorax à angles postérieurs très marqués et pointus.

**D. bicoloricollis** n. sp. ♂. Oblongo subelongatus, nitidus, niger, thorace lateraliter late rubro notato; antennis sat validis; thorace breve et lato, lateraliter medio

longe lateque lobato et dentato, supra impresso; elytris thorace non latioribus, parallelis, medio subcostulatis, diverse pro parte fortiter punctatis. Long. 5 mill. Tonkin. — Voisin du précédent, avec le prothorax autrement conformé et coloré.

Genre *Daiphron* Gorh. Plusieurs formes nouvelles, originaires du Brésil, voisines de *D. polemoides* Kir., par le prothorax caréné de chaque côté, ayant les antennes épaisses, l'aspect mat, les élytres subparallèles, les pattes pas très longues, sont : insectes à coloration générale noire avec partie de la tête en avant et côtés du prothorax flaves (*externe*), ou avec le prothorax rougeâtre à bande médiane noire, élargie en arrière (*batasitense*), ou avec les épaules marquées de roux et les côtés du prothorax de cette même coloration (*jatahyense*), ou élytres maculées aux épaules et fasciées transversalement de roux orangé (*piresense*). Elytres orangées, à macule apicale noire (*pardoense*), ou élytres noires à macule humérale et externe allongée (*pauloense*). Prothorax, sur le milieu, rarement brièvement taché de noir avec les côtés plus clairs et élytres soit noires à marge externe blanche plus ou moins étendue (*mendesense*), soit à suture blanche, comme la marge latérale, tandis que le prothorax est moins court (*espiritense*). Les différentes espèces, à prothorax caréné de chaque côté, pourraient se grouper en un sous-genre que je nomme *Microdaiphron*.

*Pyrocœlia scutellaris* n. sp. Oblongo-elongatus, niger, thorace, pectore pro parte, coxis abdomineque toto testaceis; thorace antice arcuato, medio carinulato; elytris oblongo-elongatis, paulo costulatis. Long. 17 mill. Chine. — Ressemble à *sanguiniventer* E. Ol., en diffère par la forme subparallèle, le prothorax plus clair, le dessus de l'abdomen entièrement clair.

*P. pygidialis* n. sp. Oblongo-elongatus, rubro-testaceus, capite, membris elytrisque nigris; thorace antice medio prolongato, testaceo, postice rubro notato; elytris sat brevibus et parum latis, fere incostatis; pygidio apice subsinuato, non angulato. Long. 12 mill. Yunnan. — Voisin de *rufa* E. Ol., s'en distingue, à première vue, par la structure du pygidium et les cuisses foncées.

*P. submarginata* n. sp. Oblongo-elongatus, niger, elytris postice minute flavo marginatis, abdomine pro parte flavo, pectore, scutello thoraceque testaceis, illo medio paulo obscuriore et rufo tincto, antice arcuato; elytris costatis; abdomine infra nigro, apice flavo, supra nigro et late flavo marginato. Long. 20 mill. Tonkin. Voisin de *pectoralis* E. Ol., caractérisé par le prothorax marqué de foncé, les élytres en partie, et étroitement, bordées de clair.

*Lucidina binhana* n. sp. Oblongus, opacus, niger, thorace testaceo, circa brunnescente, pygidio testaceo; antennis valde depressis et dentatis; thorace parum breve, antice medio paulo prolongato; elytris sat latis et brevibus, subparallelis, costulatis. Long. 11 mill. Tonkin. — Ressemble à *Vitalisi* Pic, mais plus robuste, avec le prothorax moins avancé antérieurement.

*Colophotia elongata* n. sp. Angustatus, nitidus, testaceus, capite, antennis, tibiis, tarsis, elytris apice abdomineque nigris, illo apice flavo. Long. 5 mill. Tonkin. — Voisin de *præusta* Esch., plus allongé avec le dessus du corps et les pattes en partie foncées.



- Prothorax un peu élargi, présentant, sur coloration générale testacé-rougeâtre, une macule discale noire. — Vénézuëla. *notatithorax* n. sp.
8. Elytres à calus huméral noir, autrement dit entièrement foncées ; prothorax étroitement marginé de blanc. 9
- Elytres marquées de roux aux épaules ; prothorax largement roux, ou testacé, sur les côtés. — Vénézuëla. *rufohumeralis* n. sp.
9. Prothorax assez robuste, muni d'une forte impression postérieure médiane. — Bolivie. *impressithorax* n. sp.
- Prothorax moins robuste, simplement sillonné sur son milieu postérieur. — Brésil. *brevesulcatus* n. sp.
10. Elytres largement de coloration orangée ou jaune. 11
- Elytres orangées, bimaculées de noir, 1<sup>re</sup> macule post-humérale, 2<sup>e</sup> antéapicale, celles-ci allongées. — Bogota. *4-maculatus* n. sp.
11. Elytres noires, brièvement marquées de jaune, ou de flave, au sommet. 13
- Elytres noires, maculées de jaune orangé à l'extrémité et aussi plus ou moins largement de cette coloration vers la base. 12
12. Elytres très atténuées postérieurement, à macule apicale petite ; prothorax noir, bordé étroitement et diversément de flave sur les côtés. — Pérou. *binotatus* n. sp.
- Elytres peu atténuées postérieurement, à macule apicale plus large ; le prothorax orangé, à bande médiane noire large. — Pérou. *latevittatus* n. sp.
13. Prothorax noir, bordé de testacé-jaunâtre ; élytres modérément élargies aux épaules. — Brésil. *bahiensis* n. sp.
- Prothorax testacé, bilinéolé de noir postérieurement ; élytres plus élargies aux épaules. — Brésil. *diamantinensis* n. sp.

Trois autres espèces nouvelles peuvent provisoirement se classer dans le genre *Malthesis* Mots. ; elles ont les élytres longues et subparallèles (ces organes sont plus longs que chez les espèces qui précèdent), recouvrant presque complètement les ailes et l'avant-corps moins robuste, le prothorax plus étroit que les diverses espèces précédentes ; elles ont les élytres entièrement noires et le dessous du corps bicolore, se rapprochent de *Malthinus sellatus* Bl., et se distinguent de la façon suivante :

1. Prothorax presque mat, noir, étroitement marginé de flave. — Bolivie. *cinctithorax* n. sp.
- Prothorax brillant, soit testacé-rougeâtre concolore et muni d'une longue impression sillonnée (*innotatithorax* n. sp. de Bolivie), soit marqué brièvement de noir en avant et largement impressionné en arrière (*brevenotatus* n. sp. du Pérou).

M. PIC.

## Coléoptères exotiques en partie nouveaux

(Suite.)

*Tillus bifasciatus* n. sp. Angustatus, nitidus, hirsutus, niger, labro membrisque testaceis, femoribus nigro notatis, elytris post medium et ante apicem transverse et recte luteo fasciatis ; capite thoracéque parum robustis, parum et diverse punctatis,

illo postice strangulato; elytris antice fortiter lineato-punctatis et postice minute punctatis. Long. 5 mill. Tonkin (coll. Pic). — Espèce distincte entre toutes par ses élytres postérieurement bifasciées.

*Neoclerus ater* n. sp. Sat elongatus, parum nitidus, sparse griseo pubescens et longe hirsutus, niger, elytris ad medium transverse griseo maculato-fasciculatis, his fortiter striatis et antice fortiter lineato-punctatis; antennis validis et brevibus, clava triarticulata, oculis minutis, paulo prominulis, fere integris; thorace elongato, ruguloso-punctato; femoribus sat gracilibus. Long. 5 mill. Tonkin (coll. Pic). — Je crois devoir classer cette espèce dans le genre *Neoclerus* Lewis; elle est très caractérisée par sa sculpture élytrale jointe à sa coloration générale foncée.

*Pelonium atricorne* n. sp. Elongatus, nitidus, griseo pubescens et hirsutus, rufus, elytris luteis, ad humeros et ad medium externe brunneo notatis, his irregulariter pro parte minute, pro parte fortiter, punctatis, postice paulo dilatatis, antennis, geniculis, tibiis externe tarsisque nigris; capite thoraceque sat minute et sparse punctatis. Long. 10 mill. Sikkim (coll. Pic). — A placer près de *discrepans* Gorh.

*Callichroma notaticeps* n. sp. Subparallelus, supra opacus, infra corpore capiteque nigro-violaceis, illo in vertice rufo notato, thorace rufo, minute nigro marginato, breve, fortiter tuberculato, scutello nigro, elytris dimidio antice rufo-aurantiacis, apice nigro velutinis, antennis testaceis, sat gracilibus; pedibus rufis, tibiis posticis apice nigro notatis, unguibus nigris. Long. 28 mill. Laos (coll. Pic). — Voisin de *C. bimaculatum* W., distinct par ses antennes entièrement claires et sa particulière coloration.

*Pachyteria testaceicornis* n. sp. Elongatus, postice paulo attenuatus, nitidus, rufo-testaceus, capite pro majore parte, thorace, scutello et infra corpore nigris, abdomine et dimidio postice elytrorum violaceo-metallicis; thorace parum breve, inæquale, lateraliter valde tuberculato, medio opaco; elytris sat latis, postice paulo attenuatis; pedibus posticis longissimis. Long. 45 mill. Annam (coll. Pic). — Grande et jolie espèce pouvant se placer près de *spinicollis* Pasc.; en diffère, en outre de la coloration, par la structure de son prothorax.

*Bradymerus viridescens* n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, fere glaber, niger, supra viridi-metallicus; thorace parum breve, angulis prominulis, lateraliter subsinuato, medio sulcato, sat dense punctato; elytris fortiter striato-punctatis, intervallis costatis. Long. 8 mill. Tonkin (ex. de Cooman, in coll. Pic). — Espèce très distincte par sa coloration, pouvant se placer près de *Vitalisi* Pic.

L'espèce (décrite comme *Bradymerus*) sous le nom de *simplicithorax* Pic (*Mél. Exot. Ent.* 46, p. 21) peut rentrer dans un nouveau genre que je nomme *Pseudobradymerus*, caractérisé par une forme courte et large, le prothorax court et large, largement explané et simple sur les côtés, la tête très angulée de chaque côté près des yeux, les antennes courtes, élargies presque dès la base, les élytres ornées de fines côtes saillantes avec les intervalles larges.

(A suivre.)

M. Pic.

# TABLE DES MATIÈRES

## de la « Revue Linnéenne »

41<sup>e</sup> et 42<sup>e</sup> années depuis la fondation

—  
1925-1926  
—

Numéros 419 à 426

Coléoptères exotiques en partie nouveaux, par M. Pic (suite), p. 3, 8, 11, 15 (1925);  
4, 8, 12, 15 (1926).

Hyménoptères nouveaux, par M. Pic, p. 12, 14 (1925); 14 (1926).

Malacodermes exotiques (hors-texte), par M. Pic, p. 5 à 36.

Notes diverses, descriptions et diagnoses, par M. Pic, p. 1, 5, 9, 13 (1925); 1, 5,  
9, 13 (1926).

Réflexions pratiques et réfléchies, par M. Pic, p. 4 (1925).

Sur quelques Rhopalocères paléarctiques, par Paul Pionneau, p. 7 (1925); 2, 7 (1926).

Sur le genre *Malthesis* Mots., par M. Pic, p. 14 (1926).

\*\*

Bibliographie sur la couverture du N° 421.

Nécrologie sur la couverture du N° 424.

Notes de chasses sur la couverture des N°s 419, 421, 422 et 425.